

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ลูกแพะกินน้ำนมเหลืองภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอดให้มากที่สุดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในลูกแพะ
2. ควรเริ่มหัดให้ลูกแพะกินอาหารเสริมที่อายุ 2 สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของกระเพาะหมัก
3. ควรหย่านม และแยกลูกแพะที่อายุ 3 เดือน และเสริมอาหารซีพี 991-18 เพื่อความสมบูรณ์ของลูกแพะ การแยกลูกแพะเร็วจะทำให้แม่แพะกลับมาเป็นสัด
4. ควรหัดให้ลูกแพะกินอาหารหยาบคุณภาพดีในช่วง 1 สัปดาห์สุดท้ายก่อนหย่านม และจัดหาน้ำสะอาดให้ลูกแพะกินอย่างเต็มที่
5. ควรแยกลูกแพะเพศผู้ และเพศเมียออกจากกัน เมื่ออายุ 4 เดือน เพื่อไม่ให้แพะผสมพันธุ์กันเอง ก่อนถึงอายุที่เหมาะสม
6. แม่แพะที่ตั้งท้องมากกว่า 3 เดือน ควรเพิ่มอาหารเป็นพิเศษเพื่อความสมบูรณ์ของแม่และลูก



ซีพี

อาหารแพะ
ทุกครั้งที่เลี้ยงสัตว์นึกถึง
ซีพีเอฟ



ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ซีพี

ซีพี

อาหารแพะ
อาหารคุณภาพดี ที่ได้มาตรฐาน



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบริหารและพัฒนาภาคใต้

271 ถนนวิภาวดีรังสิต (บางเขน) กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-580-4531, 02-580-4533 (โทรสาร) 02-580-9600

www.cpfthailand.com

ซีพี 991-18

สำหรับลูกแพะ
แรกเกิด - 4 เดือน



- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- ผลิตจากวัตถุดิบที่ย่อยง่าย
- มีคุณค่าทางอาหารสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
- เสริมสร้างกระดูกและโครงสร้าง

● ความชื้นไม่มากกว่า 13%	● โปรตีนไม่น้อยกว่า 18%
● ไขมันไม่น้อยกว่า 3.5%	● เยื่อใยไม่มากกว่า 8%

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ ลูกแพะแรกเกิดถึงก่อนย้าย

อายุ	อาหารที่แนะนำ	ปริมาณ(ตัว/วัน)
แรกเกิด - 3 วัน	นมแม่เหลือ	10-12% น้ำหนักตัว
4 วัน - 2 สัปดาห์	นมสตรหรือนมผง	เริ่มให้กินวันละน้อย
2 สัปดาห์ขึ้นไป - หย่านม	นมผงสตรหรือนมผง	เริ่มให้กินวันละน้อยแล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณ
	ซีพี 991-18	
	หญ้าคุณภาพดี	กินเสริม

การให้นมผง : นองละลายน้ำ 1:7 นมที่ให้ควรอุ่นประมาณ 40 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ

- ควรให้ลูกแพะได้รับนมแม่เหลือ รวดเร็วที่สุดหลังคลอด
- ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ควรให้ลูกแพะได้อยู่กับแม่แพะตลอดเวลา เพื่อให้ลูกแพะได้กินนมอย่างเต็มที่

ซีพี 991-14

สำหรับแพะรุ่น แพะขุน
แพะท้องว่าง และท้อง
ไม่เกิน 3 เดือน



- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- มีคุณค่าทางอาหารสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
- โดโว น้ำหนักดี
- สร้างกล้ามเนื้อ

● ความชื้นไม่มากกว่า 13%	● โปรตีนไม่น้อยกว่า 14%
● ไขมันไม่น้อยกว่า 3%	● เยื่อใยไม่มากกว่า 10%

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ

แพะรุ่น แพะขุน แพะท้องว่างและท้องไม่เกิน 3 เดือน เพื่อยั่งยืน

อายุ	ซีพี 991-14 (กรัม/ตัว/วัน)	อาหารขยาย
แพะรุ่นพันธุ์-แพะขุน	550-700 กรัม	หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่
● น้ำหนักตัว 20-30 กิโลกรัม		
● น้ำหนักตัว 31-40 กิโลกรัม		
● น้ำหนักตัว 41-50 กิโลกรัม		
แพะระยะผสมพันธุ์ตั้งท้อง 3 เดือน	400-500 กรัม	หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่
● แพะสาวท้องแรก		
● แพะนาง		
แพะพ่อพันธุ์	450-1,000 กรัม	หญ้าสด/ฟางข้าว กินเต็มที่

หมายเหตุ

- ปริมาณอาหารขั้นที่ให้อันขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณอาหารขยายที่ได้รับ
- การเสริมอาหารให้กับแพะในระยะผสมพันธุ์ช่วยเพิ่มอัตราการผสมติด/ลูกแฝด

ซีพี 991-16

สำหรับแพะรีดนม
และแพะท้องมากกว่า
3 เดือน



- ไม่มีส่วนผสมของยูเรีย
- ให้โปรตีนและพลังงานสูง
- มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับแพะท้องและแพะระยะให้นม

● ความชื้นไม่มากกว่า 13%	● โปรตีนไม่น้อยกว่า 16%
● ไขมันไม่น้อยกว่า 3%	● เยื่อใยไม่มากกว่า 10%

โปรแกรมการใช้อาหารแพะ

แพะท้องมากกว่า 3 เดือน – แพะให้นม

ระยะการให้ผลผลิต	ซีพี 991-16 (กรัม/ตัว/วัน)	อาหารขยาย
แพะท้อง 3 เดือนขึ้นไป - คลอด	600-800 กรัม	หญ้าสด กินเต็มที่
แพะระยะเลี้ยงลูก/ให้นม	800-1,500 กรัม	หญ้าสด กินเต็มที่

หมายเหตุ

- การเสริมอาหารให้กับแม่แพะในระยะตั้งท้อง 1 เดือนก่อนคลอด ช่วยลดปัญหา "ท้องเป็นพิษ" หลังคลอด
- ปริมาณอาหารที่ให้กับแม่แพะในระยะเลี้ยงลูก/ให้นม จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกที่คลอด/ปริมาณน้ำนมที่ผลิต